Farmacología y Farmacoterapia I

Grado en Farmacia - UAH

Tema 27 (curso 2021-2022)

Mediadores celulares.

Prof. Federico Gago Badenas
Universidad de Alcalá
(federico.gago@uah.es)

Células del Sistema Inmunitario

TIPO CELULAR	FUNCIÓN
Inmunidad innata	
Macrófago	Célula residente en los tejidos derivada de monocito Fagocita desechos celulares y materias extrañas Implicado en la inflamación crónica Célula presentadora de antígeno (APC)
Célula dendrítica	Transporta y presenta antígeno a células T en los nódulos linfáticos Célula presentadora de antígeno (APC)
Neutrófilo	Fagocita y mata patógenos invasores, especialmente bacterias
Eosinófilo	Defiende frente a parásitos multicelulares
Basófilo/Mastocito	Libera histamina, leucotrienos y otros mediadores tras la exposición al antígeno
Inmunidad adaptativa	
Célula T citotóxica (T _C)	Efectora de la inmunidad celular adaptativa
Célula T <i>helper</i> (T _H)	Controla las respuestas inmunitarias adaptativas
Célula B	Sintetiza y secreta anticuerpo Célula presentadora de antígeno (APC)

Mediadores químicos de la respuesta inflamatoria

RESPUESTA	MEDIADORES
Vasodilatación	Histamina Prostaglandinas (PG) PGI ₂ , PGE ₁ , PGE ₂ , PGD ₂ Óxido nítrico (NO)
Permeabilidad vascular aumentada	Aminas vasoactivas (histamina y serotonina) C3a, C5a (componentes del complemento) Bradicinina Leucotrienos (LT), especialmente LTC ₄ , LTD ₄ , LTE ₄ Factor activador plaquetar (PAF) Sustancia P Péptido relacionado con el gen de calcitonina (CGRP)
Quimiotaxis y activación leucocitaria	C5a LTB ₄ , lipoxinas (LX) LXA ₄ , LXB ₄ Productos bacterianos
Daño tisular	Productos lisosomales de neutrófilos y macrófagos Radicales de oxígeno NO
Fiebre	Interleucina-1 (IL-1) , IL-6, factor de necrosis tumoral (TNF) LTB ₄ , LXA ₄ , LXB ₄
Dolor	PGE ₂ , PGI ₂ Bradicinina CGRP

Signos clásicos de la inflamación

- *rubor* (enrojecimiento)
- *calor*
- *tumefacción* (hinchazón)
- *dolor*
- *functio laesa* (pérdida de función)

Daño tisular → liberación de mediadores inflamatorios:

- dilatación arteriolas y vénulas poscapilares → incremento flujo sanguíneo → enrojecimiento y calor
- contracción de células endoteliales vasculares → incremento permeabilidad capilar y formación exudado (fluido extracelular con alto contenido proteico)

Exudado → manifestaciones clínicas de hinchazón y dolor por el aumento de presión en el tejido.

Síntesis y metabolismo de la histamina

Subtipos de Receptores de Histamina

SUBTIPO DE RECEPTOR	MECANISMO DE SEÑALIZACIÓN POSRECEPTOR	DISTRIBUCIÓN TISULAR
H ₁	G _{q/11} → ↑ IP ₃ , DAG y Ca ²⁺ i.c., NF-κB activado	Músculo liso, endotelio vascular, cerebro (autoreceptor)
H ₂	G _s → ↑ AMPc	Células parietales gástricas, músculo cardíaco, mastocitos, cerebro
H ₃	G _{i/o} → ↓ AMPc	SNC y algunos nervios periféricos
H ₄	G _{i/o} → ↓ AMPc, ↑ Ca ²⁺ i.c.	Células hematopoyéticas, mucosa gástrica

G, proteína G; AMPc, adenosina monofosfato cíclico; IP₃, inositol trifosfato; DAG, diacilglicerol; NF-κB, factor nuclear kappa B; SNC, sistema nervioso central.

Efectos de la Histamina

- Disminución de la resistencia vascular periférica (mediada por H₁ y H₂): enrojecimiento, dolor de cabeza.
- Aumento de la permeabilidad vascular, especialmente postcapilar (H₁): edema local
- Estimulación de terminales nerviosas: dolor
- Taquicardia: directa (H₂) y refleja
- Aumento de la secreción ácida gástrica (H₂) y la motilidad gastrointestinal (H₁)

La respuesta vascular triple de Lewis

1) enrojecimiento inmediato, por vasodilatación

2) enrojecimiento, dependiente de inervación (“reflejo axónico”)

3) tumefacción (hinchazón) tardía y palidez

→ refleja el exudado desde los capilares hacia los tejidos = base del **edema inflamatorio**.

El componente clave en 1) y 3) es la **histamina**.

Liberación de histamina de mastocitos por "secretagogos básicos"

✓ aunque se activan clásicamente por anticuerpos IgE, una propiedad única de los mastocitos es su **responsividad independiente de anticuerpo IgE** a un conjunto de sustancias catiónicas, entre las que se encuentran:

- el conocido como **compuesto 48/80** y variantes cicladas que contienen un anillo de tetrahydroisoquinolina,
- péptidos inflamatorios, e.g. **mastoparan**, del veneno de avispa,
- fármacos peptídicos, e.g. el antagonista de bradicinina **icatibant** administrado por vía i.v. en dosis elevadas (*injection site reaction*), el antibiótico **vancomicina** (*síndrome del hombre [cuello] rojo* – factor de riesgo = velocidad de infusión),
- fármacos de bajo peso molecular asociados con **reacciones pseudoalérgicas o anafilactoides** tras su administración i.v., como bloqueantes neuromusculares no-esteroides (**tubocurarina**, **atracurio**, etc), antibióticos fluoroquinolónicos (e.g. **ciprofloxacino**), opioides (**morfina**, **codeína**), etc.

✓ proceso dependiente del receptor acoplado a proteínas G conocido como **MRGPRX2**.

McNeil et al. *Nature* 519:237-41 (2015)

Liberación de histamina de mastocitos por "secretagogos básicos"

Shuto H, Sueyasu M, Otsuki S, Hara T, Tsuruta Y, Kataoka Y, Oishi R. Potentiation of vancomycin-induced histamine release by muscle relaxants and morphine in rats. *Antimicrob Agents Chemother.* 43(12):2881-4 (1999)

Potenciación de la liberación de histamina por relajantes musculares

Shuto H, Sueyasu M, Otsuki S, Hara T, Tsuruta Y, Kataoka Y, Oishi R. Potentiation of vancomycin-induced histamine release by muscle relaxants and morphine in rats. *Antimicrob Agents Chemother.* 43(12):2881-4 (1999)

Estrategias en la Farmacología de la Histamina

ESTRATEGIA	EJEMPLO DE AGENTE FARMACOLÓGICO	EJEMPLO DE ENFERMEDAD TRATADA
Administrar antagonistas (o agonistas inversos) del receptor H ₁	Difenhidramina Loratadina, ebastina Fexofenadina	Alergias (rinitis, dermatitis, conjuntivitis); urticaria; resfriado común
Prevenir la desgranulación de los mastocitos	Cromoglicato sódico	Asma alérgico (uso profiláctico)
Administrar <u>antagonistas fisiológicos</u> para contrarrestar los efectos patológicos de la histamina	Adrenalina 1‰ s.c.	Anafilaxia

Estabilizadores de la membrana del mastocito

Estabilizadores de la membrana del mastocito

>1 siglo de progreso: histamina y antihistamínicos

Fármacos antihistamínicos

Primera generación:

- estructura básica consistente en 2 anillos aromáticos unidos por un corto esqueleto sustituido.
- se dividen en 6 subgrupos principales atendiendo a sus cadenas laterales sustituidas:
 - etanolaminas: difenhidramina, clemastina, dimenhidrinato...
 - etilenodiaminas: pirilamina, tripilamina...
 - alquilaminas: clorfeniramina, bromfeniramina...
 - piperazinas: ciclizina, hidroxizina...
 - fenotiazinas: prometazina...
 - piperidinas: ciproheptadina...
- compuestos neutros a pH fisiológico que atraviesan la barrera hematoencefálica.
- tendencia a producir depresión del SNC (somnia).

Segunda generación:

- categorizados estructuralmente en 4 subclases:
 - alquilaminas
 - piperazinas: cetirizina (metabolito principal de la hidroxizina; isómero levo más activo).
 - ftalazinonas
 - piperidinas: loratadina, fexofenadina (metabolito de terfenadina), ebastina
- ionizados a pH fisiológico, no cruzan la barrera hematoencefálica de forma apreciable.

Potenciales efectos adversos de los anti-H₁ de primera generación

hERG (human ether-a-go-go related gene): subunidad formadora de poro de un canal de K⁺ (Kv11.1)

Cell

Cryo-EM Structure of the Open Human Ether-à-go-go-Related K⁺ Channel hERG

Weiwei Wang¹ and Roderick MacKinnon^{1,2,*}
¹Laboratory of Molecular Neurobiology and Biophysics, The Rockefeller University and Howard Hughes Medical Institute, 1230 York Avenue, New York, NY 10065, USA

Origen y proyecciones del sistema histaminérgico en el cerebro humano

Posición clave en la regulación de funciones corporales básicas incluyendo ciclo sueño-vigilia, homeostasis energética y endocrina, plasticidad sináptica y aprendizaje.

Farmacología del sistema histaminérgico en el cerebro humano

- La liberación de histamina en el SNC sigue un patrón circadiano: neuronas activas por el día y en descanso por la noche.
- Los receptores H₁ de la corteza y la formación reticular activadora contribuyen a la alerta y la vigilia.
- Los antagonistas H₁ que atraviesan la BHE producen sedación (efecto secundario) aunque algunos se emplean como inductores del sueño en medicamentos que no requieren receta médica (**OTC**):

➤ Doxilamina: también para prevenir náuseas matutinas en embarazadas

Valores de pA_2 de algunos fármacos clínicamente útiles

Serotonina (5-HT): síntesis a partir del aminoácido triptófano

Acciones de la serotonina (5-HT)

- ✓ aumento de la motilidad gastrointestinal (excitación directa del músculo liso y acción indirecta *via* neuronas entéricas),
- ✓ contracción de musculatura lisa bronquial y uterina,
- ✓ mezcla de constricción vascular (directa y *via* inervación simpática) y dilatación (dependiente de endotelio),
- ✓ agregación plaquetar,
- ✓ estimulación de terminales nerviosas nociceptivas periféricas,
- ✓ excitación/inhibición de neuronas del SNC.

Funciones de la serotonina (5-HT)

Entre los papeles fisiológicos y patofisiológicos se encuentran:

- ✓ en la periferia:
 - peristaltismo (contracciones musculares undulantes que hacen avanzar los alimentos a lo largo del tracto digestivo),
 - vómito,
 - agregación plaquetaria y homeostasis,
 - mediador inflamatorio,
 - sensibilización de nociceptores,
 - control microvascular.
- ✓ en el SNC:
 - control del apetito, sueño, estado de ánimo, alucinaciones, comportamiento estereotipado, percepción de dolor, vómito, etc.

Patologías asociadas con un mal funcionamiento del sistema 5-HT: migraña, síndrome carcinoide, ansiedad, trastornos del estado de ánimo, etc.

Características de una sinapsis serotoninérgica

Las neuronas que fabrican serotonina se proyectan a muchas áreas cerebrales superiores

Fármacos de uso clínico que actúan sobre receptores de 5-HT en la periferia

- ◆ **Agonista parcial/Antagonista 5-HT₁**: ergotamina y dihidroergotamina.
- ◆ **Agonistas 5-HT_{1B/D}**: "triptanes" → tratamiento migrañas (sumatriptán, zolmitriptán, etc): formas FLAS (comprimidos bucodispersables)
- ◆ **Antagonistas 5-HT₂**: metisergida, ciproheptadina, ketanserina, ketotifeno, pizotifeno (ppalmente. 5-HT_{2A} pero también otros R's: 5-HT, histaminérgicos y α-adrenérgicos).
- ◆ **Antagonistas 5-HT₃**: "setrones" → prevención y control de las náuseas y vómitos inducidos por antineoplásicos (dolesatrón, granisetrón, ondansetrón, palonosetrón, tropisetrón).
- ◆ **Agonistas 5-HT₄**: metoclopramida (además de bloquear R de dopamina), prucaloprida (la cisaprida fue retirada por producir bloqueo hERG).

PATOGÉNESIS DE LA MIGRAÑA

CGRP (calcitonin gene-related peptide) y migraña

Russell FA et al. *Physiol Rev* 2014;94:1099.

Componentes de la transmisión CGRP y sitios de acción para las terapias de la migraña relacionadas con CGRP.

Anticuerpos (aprobados) frente a:

- receptor CGRP: **erenumab**
- CGRP: **fremanezumab**
galcanezumab

Bases estructurales del reconocimiento molecular en receptores de serotonina

Bloqueo de receptores 5-HT₃ para prevenir los vómitos asociados con la terapia antineoplásica

RUTAS POR LAS QUE MUCHOS AGENTES ANTICANCEROSOS PUEDEN PRODUCIR UNA RESPUESTA EMÉTICA

La serotonina liberada de las células cromafines del intestino como consecuencia del tratamiento antineoplásico interacciona con las terminales aferentes vagales en la pared intestinal que se proyectan al tallo cerebral dorsal, principalmente al núcleo del tracto solitario (NTS) y al área postrema (AP / CTZ), donde existen receptores 5-HT₃ y D₂, con un papel importante en la respuesta emética.

Hesketh: *N Engl J Med*, 358(23):2482-2494 (2008)

Factores implicados en el control del vómito y sitio de acción de los principales fármacos antieméticos

Metabolismo del ácido araquidónico

Biosíntesis de los eicosanoides

Mediadores inflamatorios derivados de fosfolípidos de membrana: acciones y puntos de intervención farmacológica

Receptores de prostanoideos y sus rutas primarias de señalización

Orden de potencias:

IP: PGI₂ >> PGD₂, PGE₂, PGF_{2α} > TXA₂

EP₁: PGE₂ > PGF_{2α}, PGI₂ > PGD₂, TXA₂

EP₂: PGE₂ > PGF_{2α}, PGI₂ > PGD₂, TXA₂

EP₃: PGE₂ > PGF_{2α}, PGI₂ > PGD₂, TXA₂

EP₄: PGE₂ > PGF_{2α}, PGI₂ > PGD₂, TXA₂

DP₁: PGD₂ >> PGE₂ > PGF_{2α} > PGI₂, TXA₂

DP₂: PGD₂ >> PGF_{2α}, PGE₂ > PGI₂, TXA₂

FP: PGF_{2α} > PGD₂ > PGE₂ > PGI₂, TXA₂

TP: TXA₂ = PGH₂ >> PGD₂, PGE₂, PGF_{2α}, PGI₂

Usos clínicos de los prostanoideos

- **Gastrointestinal:**
 - prevenir úlceras asociadas con el uso de AINES: **misoprostol**.
- **Ginecología y obstetricia:**
 - inducción del parto: **dinoprostona** o **misoprostol**.
 - terminación del embarazo: **misoprostol**.
 - prevención y tratamiento del sangrado posparto: **misoprostol**.
- **Andrología:**
 - corregir la disfunción eréctil: **alprostadil**.
- **Cardiovascular:**
 - mantener la apertura del conducto arterioso, hasta que sea realizada la cirugía paliativa o correctiva, en niños nacidos con defectos cardíacos (e.g. tetralogía de Fallot, atresia tricuspídea o mitral, estenosis aórtica, etc): **alprostadil**.
 - inhibir la agregación plaquetar (por ej., durante la hemodiálisis), especialmente si la heparina está contraindicada: **epoprostenol**.
 - hipertensión pulmonar primaria: **epoprostenol**.
- **Oftálmico:**
 - glaucoma de ángulo abierto: **latanoprost**, **bimatoprost**, **tafluprost** y **travoprost**.

Misoprostol

Análogo metabólicamente estable de PGE y activo por vía oral que:

- estimula la producción de moco y bicarbonato por las células parietales gástricas
- inhibe la secreción de ácido gástrico

➤ Indicaciones

Tratamiento de la úlcera duodenal.

Prevención de lesiones gastrointestinales inducidas por antiinflamatorios no esteroideos (AINE), limitada a sujetos cuyo tratamiento a largo plazo con AINE es indispensable.

El efecto secundario más frecuente es la diarrea, que suele ser de intensidad suave a moderada.

En comprimidos vaginales:

1. Interrupción terapéutica del embarazo intrauterino
2. Dilatación y preparación del cuello uterino antes de la terminación quirúrgica del embarazo
3. Inducción al parto en la muerte fetal intrauterina
4. Tratamiento farmacológico del aborto espontáneo y diferido.

Dinoprostona (PGE₂)

▪ promueve contracciones coordinadas del útero grávido y relaja el cérvix.

➤ **Indicación:** Iniciación de la maduración cervical en pacientes a término (desde la 38ª semana de gestación), como gel endocervical (0,5 mg) o sistema polimérico de liberación vaginal (10 mg).

Epoprostenol (= prostaciclina = PGI₂)

- Inhibe la agregación plaquetar
- Eficaz vasodilatador

➤ **Indicación:** tratamiento de síntomas de la hipertensión pulmonar primaria (inyección i.v.)

Alprostadil = (-)PGE₁

➤ Indicación:

Tratamiento de la disfunción eréctil:

- 10 ó 20 µg en solución inyectable

- 250 ó 500 µg en bastoncillo uretral

MUSE (*Medicated Urethral Suppository for Erection*): sistema transuretral unidosis estéril para la administración en la uretra masculina

Análogos de PGF_{2α}

Latanoprost

- profármaco (éster isopropílico): hidrólisis por esterasas en la córnea para dar el ácido biológicamente activo,
- reduce la presión intraocular al aumentar la salida de humor acuoso del ojo a través del tracto uvealesclear.
- **Indicación:** reducción de la presión intraocular elevada en pacientes con glaucoma de ángulo abierto e hipertensión ocular.
- ❖ **Advertencia:** puede cambiar gradualmente el color de los ojos debido a hiperpigmentación del iris. Idem párpados.

Bimatoprost

- semejante a latanoprost
- nueva indicación para la solución al 0.03% en EE.UU, con receta médica, para aumentar la longitud, espesor y pigmentación de las pestañas en pacientes con hipotricosis → actuación responsable del farmacéutico

Fases de la respuesta inflamatoria

- ✓ reacción de la vasculatura alrededor del sitio dañado,
- ✓ reclutamiento de células circulantes del sistema inmunitario,
- ✓ neutralización y eliminación del estímulo desencadenante,
- ✓ reparación y curación del tejido dañado, y
- ✓ terminación del proceso inflamatorio agudo.

Si no se detiene y continúa, aunque con menor intensidad → **inflamación crónica**

Inflamación en infección, daño y enfermedad crónica

Todos los organismos vivos dependen de la capacidad de protegerse de patógenos exógenos y de reparar el daño tisular que resulta de una infección o un trauma. Pero la respuesta inflamatoria, por sí misma, puede resultar patológica cuando:

- es manifiestamente exagerada (“tormenta de citocinas”) tras un proceso agudo séptico o de destrucción celular,
- un defecto primario en la regulación de una ruta de señalización del “**inflamósoma**” origina una enfermedad crónica (ej. *cryopyrin-associated periodic syndromes*, CAPS, por mutaciones en *NACHT-leucine-rich repeat protein 3*),
- se dispara una **cascada autoinmune** (ej. artritis reumatoide seropositiva), o
- no erradica el estímulo primario y aparece de forma **crónica** asociada al proceso de envejecimiento (ej. aterosclerosis, obesidad, resistencia a insulina, enfermedad de Alzheimer, etc).

Inflamación en infección, daño y enfermedad crónica

Tabas I, Glass CK.

Anti-inflammatory therapy in chronic disease: challenges and opportunities. *Science* 339:166-172 (2013)

Anti-inflammatory therapy in chronic disease: challenges and opportunities. *Science* 339:166-172 (2013)

Papeles principales de la 5-Lipoxigenasa en la Aterosclerosis

A Infección

B Enfermedad inflamatoria crónica

Dianas terapéuticas en la inflamación

Citocinas: proteínas que actúan de modo paracrino para regular la actividad leucocitaria.

Las secretadas por células del linaje hematopoyético son **interleucinas**.
interleukins

En respuesta inflamatoria aguda:

- **Interleucina-1 (IL-1)**
- **Factor de necrosis tumoral α (TNF- α)**

Las **quimiocinas** promueven el tráfico de células del sistema inmunitario y su localización en los sitios de inflamación. Ejemplos:

- *macrophage chemoattractant protein-1 (MCP-1)*: promueve la trans migración y activación de los monocitos.
- *granulocyte-monocyte colony stimulating factor (GM-CSF)*: **sargramostim**
- *granulocyte colony stimulating factor (G-CSF)*: **filgrastim**

Como las citocinas afectan a la proliferación y función de las células que median las respuestas inmunitarias innata y adaptativa, la inhibición o estimulación selectiva de las acciones de las citocinas tiene el potencial de modular las respuestas inmunitaria e inflamatoria.

Desarrollo (por una compañía española) de **B12019** como biosimilar de Neulasta® (INN **pegfilgrastim**), una forma pegilada de larga duración del factor estimulador de colonias de granulocitos humano (*r-methHuG-CSF*, INN **filgrastim**) para la prevención de la neutropenia inducida por la quimioterapia antineoplásica

INN=International Nonproprietary Name

Treatment: B12019 (green line), Neulasta (purple dashed line)

1. Antagonistas de TNF

2. Otros agentes biológicos

Resumen de las terapias biológicas utilizadas en el tratamiento de la artritis reumatoide

(v. tema 26)

Robert S. Woodrick & Eric M. Ruderman
Safety of biologic therapy in rheumatoid arthritis
Nature Reviews Rheumatology 7, 639-652 (2011)

5 mecanismos de acción no solapados de anticuerpos terapéuticos

(1) Bloqueo de ligandos

Infliximab*	Belimumab
Adalimumab*	Eculizumab
Golimumab	Mepolizumab
Certolizumab pegol	Reslizumab
Canakinumab	Etanercept†
Briakinumab	Atacicept†
Ustekinumab	Alefacept†
Omalizumab*	

(2) Bloqueo de receptores

Tocilizumab
Efalizumab*
Natalizumab
Vedolizumab
Abatacept†

doi:10.1038/nri2761

5 mecanismos de acción no solapados de anticuerpos terapéuticos

(3) Regulación a la baja del número de receptores

Efalizumab*
Omalizumab*
Otelixizumab*
Teplizumab*
Epratuzumab*

(4) Agotamiento/Reducción / Merma de receptores

Rituximab*
Ofatumumab
Ocrelizumab
GA101*
Alemtuzumab
Muromonab*
Epratuzumab*

doi:10.1038/nri2761

5 mecanismos de acción no solapados de anticuerpos terapéuticos

(5) Inducción de señalización

Otelixizumab*
Teplizumab*
Muromonab*
GA101*
Infliximab*
Adalimumab*
Rituximab*

(v. tema 26)

doi:10.1038/nri2761